



# Assessment of Data Collection, Reporting, and Analysis Capacity (ARC) Tool

April 2021

# Ferramenta de Avaliação da Capacidade de Recolha de Dados, de Produção de Relatórios e de Análise (ARC)

Agradecemos desde já o preenchimento do presente formulário. O formulário está organizado em 16 secções.

## Índice

[Tuberculose \(TB\) suscetível a fármacos \(SF\)](#)

[Tuberculose \(TB\) resistente a fármacos \(RF\)](#)

[TB SF Infantil](#)

[TB RF Infantil](#)

[Rastreio da tuberculose](#)

[Tuberculose presuntiva](#)

[Contactos](#)

[Tratamento preventivo da tuberculose \(TPT\)](#)

[TB-VIH](#)

[TB Lab](#)

[Fármacos para a tuberculose e material de diagnóstico](#)

[Relatórios da tuberculose do setor privado](#)

[Tuberculose entre os profissionais de saúde \(PS\)](#)

[Unidades de saúde que prestam serviços de tuberculose](#)

[Tuberculose nas prisões](#)

[Política de tuberculose](#)

[Indicadores de](#)

[Compromisso/Autoconfiança](#)

**Deverá assinalar cada secção como concluída** no final da secção antes de submeter o formulário; contudo, o formulário irá guardar o seu progresso automaticamente e poderá voltar ao formulário mais tarde. Para navegar no formulário, poderá clicar nos links do lado esquerdo para passar para uma secção. Caso contrário, percorra para baixo na secção. Pode ver onde está com base no item de menu destacado à direita. Tenha em atenção que as perguntas têm etiquetas alfanuméricas. Estas estão presentes apenas para fins de programação e fácil referência; não têm qualquer significância ou significado real.

## **(TB SF) Suscetível a fármacos**

**ds.1.** Clique nas caixas abaixo se alguma unidade de tratamento de tuberculose (por exemplo, unidades de tratamento básico ou unidades especializadas para o tratamento da tuberculose) registrar dados sobre:

- ☐ ds.1.1a. Casos novos e recidivos de tuberculose e casos com histórico de tratamento prévio desconhecido da tuberculose (todas as formas)
- ☐ ds.1.1b. Casos novos e recidivos de tuberculose (bacteriologicamente confirmados ou clinicamente diagnosticados, pulmonares ou extrapulmonares)
- ☐ ds.1.2. Casos novos e recidivos de tuberculose nas Unidades de Tratamento Básico com dados sobre os encaminhamentos por parte dos profissionais de saúde comunitários
- ☐ ds.1.3. Casos novos e recidivos de tuberculose encaminhados por profissionais de saúde comunitários / voluntários comunitários para as Unidades de Tratamento Básico com dados sobre os encaminhamentos por parte dos profissionais de saúde comunitários
- ☐ ds.1.4. Pacientes com tuberculose (todas as formas) que recebem algum tipo de benefício social ou econômico durante o primeiro mês de tratamento
- ☐ ds.1.5. Tuberculose extrapulmonar (nova e recidiva) bacteriologicamente confirmada
- ☐ ds.1.6. Tuberculose extrapulmonar (nova e recidiva) clinicamente diagnosticada
- ☐ ds.1.8. Casos de tuberculose pulmonar novos e recidivos bacteriologicamente confirmados (esfregaço positivo ou cultura positiva ou positivo no teste rápido de diagnóstico recomendado pela OMS)
- ☐ ds.1.9. Casos novos e recidivos de tuberculose (pulmonares ou extrapulmonares) testados quanto à suscetibilidade à rifampicina usando DST fenotípica ou diagnósticos moleculares rápidos recomendados pela OMS (por exemplo, Xpert MTB/RIF), antes ou depois de iniciar o tratamento
- ☐ ds.1.10. Casos de tuberculose (novos e recidivos), todas as formas, que morreram durante o tratamento
- ☐ ds.1.11. Casos de tuberculose (novos e recidivos), todas as formas, que ficaram curados ou concluíram tratamento
- ☐ ds.1.12. Casos de tuberculose (novos e recidivos), todas as formas, que abandonaram o seguimento (LTFU)

- ☐ ds.1.13. Casos de tuberculose (novos e recidivos), todas as formas, que não foram avaliados
- ☐ ds.1.14. Casos de tuberculose (novos e recidivos), todas as formas, cujo tratamento falhou

**Proporção de elementos de dados PBMEF registados**  
0%

**ds.2.** O país regista os dados da TB SF desagregados por sexo?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**ds.3.** A que nível são reportados os dados da TB SF?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**ds.4.** Como são reportados os dados da TB SF?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**ds.5.** Qual a proporção de instituições prestadoras de serviços de tuberculose que reportam quaisquer dados da TB SF?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**ds.6.** Qual a proporção de instituições prestadoras de serviços de tuberculose que reportam quaisquer dados da TB SF extrapulmonar?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0% de majoração

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## **Tuberculose resistente a fármacos (TB RF)**

**dr.1.** Alguma unidade de tratamento da tuberculose (por exemplo, unidades de tratamento básico ou unidades especializadas no tratamento de TB RF) regista dados sobre casos de TB RF (RR/MRF e XRF)?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**dr.2.** O país regista alguns dados de TB RF desagregados por sexo?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**dr.3.** Quantas unidades de tratamento da tuberculose (por exemplo, unidades de tratamento básico ou unidades especializadas no tratamento de TB RF) estão a fornecer serviços de tratamento de TB RF (RR/MRF e XRF)?

**dr.5.** A que nível são reportados os dados da TB RF?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**dr.6.** Como são reportados os dados da TB RF?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**dr.4.** Das unidades de tratamento da tuberculose que prestam serviços de TB RF, quantas destas instituições reportam dados de TB RF?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**dr.7.** Clique nas caixas abaixo se alguma unidade de tratamento de TB RF (por exemplo, unidades de tratamento básico ou unidades especializadas para o tratamento da tuberculose) registar dados sobre:

- ☐ dr.7.1. Casos de TB RR/MRF
- ☐ dr.7.2. Pacientes com TB RR/MRF confirmados em laboratório

- ☐ dr.7.3. Pacientes com TB RR/MRF confirmados em laboratório, testados quanto à suscetibilidade a fármacos de segunda linha (fluoroquinolonas e agentes injetáveis de segunda linha)
- ☐ dr.7.4. Pacientes com TB RR/MRF confirmados em laboratório ou clinicamente diagnosticados, inscritos no tratamento
- ☐ dr.7.5. Pacientes com TB RR/MRF que iniciaram um regime de tratamento "totalmente oral" mais prolongado
- ☐ dr.7.6. Pacientes com TB RR/MRF que iniciaram um regime de tratamento "totalmente oral" mais curto (isto é, tratamento até 12 meses)
- ☐ dr.7.7. Pacientes com TB RR/MRF que desenvolveram reações adversas ao tratamento TB RF
- ☐ dr.7.8. Casos de pacientes com TB RR/MRF que ficaram curados ou concluíram o tratamento
- ☐ dr.7.9. Pacientes com TB RR/MRF que estavam inscritos no tratamento, mas o tratamento falhou
- ☐ dr.7.10. Pacientes com TB RR/MRF que estavam inscritos no tratamento, mas que abandonaram o seguimento
- ☐ dr.7.11. Pacientes com TB RR/MRF que estavam inscritos no tratamento e morreram durante o tratamento
- ☐ dr.7.12. Pacientes com TB RR/MRF que estavam inscritos no tratamento, mas não foram avaliados
- ☐ dr.7.13. Pacientes com TB RR/MRF que recebem intervenções e benefícios não médicos, com o objetivo de melhorar a adesão ao tratamento e reduzir os custos elevadíssimos

### Proporção de elementos de dados PBMEF registrados

0%

**xdr.7.** Clique nas caixas abaixo se alguma unidade de tratamento de TB RF (por exemplo, unidades de tratamento básico ou unidades especializadas para o tratamento da TB XRF) registrar dados sobre:

- ☐ xdr.7.1. Pacientes com XRF
- ☐ xdr.7.2. Pacientes com XRF confirmados em laboratório
- ☐ xdr.7.3. Pacientes com XRF confirmados em laboratório, testados quanto à suscetibilidade a fármacos de segunda linha (fluoroquinolonas e agentes injetáveis de segunda linha)
- ☐ xdr.7.4. Pacientes com XRF confirmados em laboratório ou clinicamente diagnosticados, inscritos no tratamento

- ☐ xdr.7.5. Pacientes com XRF que iniciaram um regime de tratamento "totalmente oral" mais prolongado
- ☐ xdr.7.6. Pacientes com XRF que iniciaram um regime de tratamento "totalmente oral" mais curto (isto é, tratamento até 12 meses)
- ☐ xdr.7.7. Pacientes com XRF que desenvolveram reações adversas ao tratamento TB RF
- ☐ xdr.7.8. Pacientes com XRF que ficaram curados ou concluíram o tratamento
- ☐ xdr.7.9. Pacientes com XRF que estavam inscritos no tratamento mas o tratamento falhou
- ☐ xdr.7.10. Pacientes com XRF que estavam inscritos no tratamento, mas que abandonaram o seguimento
- ☐ xdr.7.11. Pacientes com XRF que estavam inscritos no tratamento e morreram durante o tratamento
- ☐ xdr.7.12. Pacientes com XRF que estavam inscritos no tratamento, mas não foram avaliados
- ☐ xdr.7.13. Pacientes com XRF que recebem intervenções e benefícios não médicos, com o objetivo de melhorar a adesão ao tratamento e reduzir os custos elevadíssimos

#### **Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

0%

- ☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*



## **Tuberculose infantil suscetível a fármacos (TB SF)**

**cs.1.** Alguma unidade de tratamento da tuberculose (por exemplo, unidades de tratamento básico) regista dados sobre a tuberculose infantil?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**cs.2.** O país regista alguns dados de tuberculose infantil desagregados por sexo?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**cs.3.** Clique nas caixas abaixo se registarem alguns dados sobre:

- ☐ cs.3.1. Casos novos e recidivos de tuberculose infantil (0-14 anos), todas as formas
- ☐ cs.3.2. Casos novos e recidivos de tuberculose infantil (0-4 anos), todas as formas
- ☐ cs.3.3. Casos novos e recidivos de tuberculose infantil (5-14 anos), todas as formas
- ☐ cs.3.4. Casos novos e recidivos de tuberculose pulmonar entre crianças dos 0-14 anos
- ☐ cs.3.5a. Casos de tuberculose pulmonar clinicamente diagnosticados entre crianças dos 0-14 anos
- ☐ cs.3.5. Casos de tuberculose pulmonar bacteriologicamente confirmados entre crianças dos 0-14 anos
- ☐ cs.3.6. Casos novos e recidivos de tuberculose extrapulmonar entre crianças dos 0-14 anos
- ☐ cs.3.7a. Casos de tuberculose extrapulmonar clinicamente diagnosticados entre crianças dos 0-14 anos
- ☐ cs.3.7. Casos de tuberculose extrapulmonar bacteriologicamente confirmados entre crianças dos 0-14 anos
- ☐ cs.3.8. Crianças com tuberculose (faixa etária dos 0-4 anos), todas as formas, que ficaram curadas ou concluíram o tratamento

- ☐ cs.3.9. Crianças com tuberculose (faixa etária dos 5-14 anos), todas as formas, que ficaram curadas ou concluíram o tratamento
- ☐ cs.3.10. Crianças com tuberculose (faixa etária dos 0-14 anos), todas as formas, que ficaram curadas ou concluíram o tratamento
- ☐ cs.3.11. Crianças com tuberculose (faixa etária dos 0-14 anos), todas as formas, cujo tratamento falhou
- ☐ cs.3.12. Crianças com tuberculose (faixa etária dos 0-14 anos), todas as formas, que morreram durante o tratamento
- ☐ cs.3.13. Crianças com tuberculose (faixa etária dos 0-14 anos), todas as formas, que abandonaram o seguimento
- ☐ cs.3.14. Crianças com tuberculose (faixa etária dos 0-14 anos), todas as formas, que não foram avaliadas

### **Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

0%

**cs.4.** A que nível são reportados os dados da TB SF infantil?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**cs.5.** Como são reportados os dados da tuberculose infantil?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**cs.6.** Qual a proporção de instituições prestadoras de serviços de tuberculose que reportam quaisquer dados da tuberculose infantil?

- *Selecione* -

- ☐ 100%

- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## **Tuberculose infantil resistente a fármacos (RR/MRF e XRF)**

**cd.1.** Alguma unidade de tratamento da tuberculose (por exemplo, unidades de tratamento básico ou unidades especializadas no tratamento de TB RF) regista dados sobre casos de TB RF infantil (RR/MRF e XRF)?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**cd.2.** Alguma unidade de tratamento TB RF regista dados sobre casos de TB RF infantil (RR/MRF e XRF) desagregados por sexo?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**cd.3.** Clique nas caixas abaixo se registarem alguns dados sobre:

- ☐ cd.3.1. Pacientes com TB RR/MRF infantil (faixa etária dos 0-14 anos)
- ☐ cd.3.2. Pacientes com TB RR/MRF infantil (faixa etária dos 0-14 anos) confirmada em laboratório

- ☐ cd.3.2a. Pacientes com TB RR/MRF infantil (faixa etária dos 0–14 anos) clinicamente diagnosticada
- ☐ cd.3.3. Crianças (0-14 anos) que foram confirmadas em laboratório ou clinicamente diagnosticadas com TB RR/MRF e inscritas no tratamento
- ☐ cd.3.4. Pacientes com TB RR/MRF infantil Infância (0-14 anos) tratados com êxito (curados ou com tratamento concluído)
- ☐ cd.3.5. Pacientes com TB RR/MRF infantil (0-14 anos), cujo tratamento falhou
- ☐ cd.3.6. Pacientes com TB RR/MRF infantil (0-14 anos) que morreram durante o tratamento
- ☐ cd.3.7. Pacientes com TB RR/MRF infantil (0-14 anos) que abandonaram o seguimento
- ☐ cd.3.8. Pacientes com TB RR/MRF infantil (0-14 anos) que não foram avaliados

**Proporção de elementos de dados PBMEF registrados**

0%

**cx.d.3.** Clique nas caixas abaixo se registarem alguns dados sobre:

- ☐ cxd.3.1. Pacientes com TB XRF infantil (faixa etária dos 0-14 anos)
- ☐ cxd.3.2. Pacientes com XRF infantil (faixa etária dos 0-14 anos) confirmada em laboratório
- ☐ cxd.3.2a. Pacientes com XRF infantil (faixa etária dos 0-14 anos) clinicamente diagnosticada
- ☐ cxd.3.3. Crianças (0-14 anos) que foram confirmadas em laboratório ou clinicamente diagnosticadas com TB XRF e inscritas no tratamento
- ☐ cxd.3.4. Pacientes com XRF infantil (0-14 anos) tratados com êxito (curados ou com tratamento concluído)
- ☐ cxd.3.5. Pacientes com XRF infantil (0-14 anos), cujo tratamento falhou
- ☐ cxd.3.6. Pacientes com XRF infantil (0-14 anos) que morreram durante o tratamento
- ☐ cxd.3.7. Pacientes com XRF infantil (0-14 anos) que abandonaram o seguimento
- ☐ cxd.3.8. Pacientes com XRF infantil (0-14 anos) que não foram avaliados

**Proporção de elementos de dados PBMEF registrados**

0%

**cd.4.** A que nível são reportados os dados da TB RF infantil?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**cd.5.** Como são reportados os dados da TB RF infantil?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**cd.6.** Qual a proporção de instituições que prestam serviços de TB RF que reportam quaisquer dados da TB RF infantil?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## Rastreio da tuberculose

**sr.1.** O país regista alguns dados de rastreio da tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**sr.2.** O país regista alguns dados de rastreio da tuberculose por grupos etários (ou seja, crianças dos 0-4 anos e dos 5-14 anos; adultos com idade igual ou superior a 15 anos)?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**sr.3.** O país regista alguns dados de rastreio da tuberculose desagregados por sexo?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**sr.4.** Clique nas caixas abaixo se as instituições de saúde registarem alguns dados sobre:

- ☐ sr.4.1. Participantes rastreados para doença da tuberculose e infeção por tuberculose fora das instituições de saúde por um profissional de saúde comunitário ou outra pessoa qualificada
- ☐ sr.4.2. Participantes rastreados para a doença da tuberculose nas instituições de saúde
- ☐ sr.4.3. Participantes rastreados como positivos para a doença da tuberculose

**Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

0%

**sr.5.** A que nível são reportados os dados de rastreio da tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**sr.6.** Como são reportados os dados de rastreio da tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**sr.7.** Qual a proporção de instituições prestadoras de serviços de tuberculose que reportam quaisquer dados de rastreio da tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## Tuberculose presuntiva

**pr.1.** As instituições de saúde (ou seja, unidades de tratamento da tuberculose, unidades de tratamento básico) mantêm algum registo de casos presuntivos de tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**pr.2.** As instituições de saúde registam alguns dados de tuberculose presuntiva desagregados por grupos etários (ou seja, crianças dos 0-4 anos e dos 5-14 anos; adultos com idade igual ou superior a 15 anos)?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**pr.3.** As instituições de saúde registam alguns dados de tuberculose presuntiva desagregados por sexo?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**pr.7.** Clique nas caixas abaixo se estas instituições de saúde registarem alguns dados sobre:

- ☐ pr.7.1. Casos identificados de tuberculose presuntiva
- ☐ pr.7.2. Casos de tuberculose presuntiva testados para tuberculose
- ☐ pr.7.3. Pacientes de tuberculose presuntiva com amostra registada dentro de um prazo especificado
- ☐ pr.7.5. Pacientes de tuberculose presuntiva testados com o teste rápido de diagnóstico recomendado pela OMS
- ☐ pr.7.5a. Pacientes de tuberculose presuntiva testados com exame de esfregaço de saliva
- ☐ pr.7.5b. Pacientes de tuberculose presuntiva testados com CXR
- ☐ pr.7.6. Casos de tuberculose presuntiva que receberam uma avaliação diagnóstica e foram testados/diagnosticados como positivos para a doença da tuberculose (ou seja, diagnosticados com a doença da tuberculose ativa)



- ☐ pr.7.8. Pacientes de tuberculose presuntiva que foram excluídos para a doença da tuberculose e testados para a infeção por tuberculose durante o período abrangido pelo relatório (os testes de infeção por tuberculose incluem TST, IGRA ou ambos)

**Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

0%

**pr.5.** A que nível são reportados os dados da tuberculose presuntiva?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**pr.6.** Como é reportada a tuberculose presuntiva?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**pr.4.** Qual a proporção de instituições que reportam quaisquer dados da tuberculose presuntiva?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## **Contactos**

**c.1.** O país possui uma política, SOP ou orientações que indiquem como proceder ao rastreio de contactos?

- *Selecione* -

☐ Sim

☐ Não

**c.2.** Estão disponíveis ferramentas normalizadas de registo e de apresentação de relatórios (por exemplo, registo de contactos, ferramenta de rastreio, formulários para relatórios (eletrónicos ou em papel)) para rastreio e análise de contactos?

- *Selecione* -

☐ Sim

☐ Não

**c.3.** O país realiza sistematicamente o rastreio de contactos para casos de tuberculose bacteriologicamente confirmados?

- *Selecione* -

☐ Sim

☐ Não

**c.4.** O país regista alguns dados sobre contactos de casos de tuberculose bacteriologicamente confirmados?

- *Selecione* -

☐ Sim

☐ Não

**c.5.** O país regista alguns dados de contactos por grupos etários (ou seja, crianças dos 0-4 anos e dos 5-14 anos; adultos com idade igual ou superior a 15 anos)?

- *Selecione* -

☐ Sim

☐ Não

c.6. O país regista alguns dados de contactos familiares desagregados por sexo?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

c.8. Clique nas caixas abaixo se as instituições de saúde registarem alguns dados sobre:

- ☐ c.8.1. Contactos de pacientes com tuberculose pulmonar, nova e recidiva, bacteriologicamente confirmada (adultos, crianças dos 5-14)
- ☐ c.8.2. Contactos de pacientes (crianças <5) com tuberculose pulmonar, nova e recidiva, bacteriologicamente confirmada
- ☐ c.8.4. Contactos de pacientes com tuberculose pulmonar bacteriologicamente confirmada que foram rastreados para a doença da tuberculose
- ☐ c.8.5. Contactos que foram excluídos para a doença da tuberculose e que foram testados para a infeção por tuberculose (através de TST, IGRA ou ambos)
- ☐ c.8.6. Contactos que foram excluídos para a doença da tuberculose e que testaram positivo à infeção por tuberculose
- ☐ c.8.7. Casos de tuberculose identificados (bacteriológica e clinicamente) entre os contactos
- ☐ c.8.8. Casos TB RF (TB RR/MRF e XRF) identificados entre os contactos

**Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

0%

c.9. A que nível são reportados os dados de contactos de tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**c.10.** Como são reportados os dados de contactos de tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**c.11.** Qual a quantidade de instituições que prestam serviços de tuberculose reportam quaisquer dados de contactos de tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## Tratamento preventivo da tuberculose (TPT)

tpt.1. O país regista alguns dados de tratamento preventivo da tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

tpt.2. O país regista alguns dados de rastreio de indivíduos em TPT por grupos etários (ou seja, crianças dos 0-4 anos e dos 5-14 anos; adultos com idade igual ou superior a 15 anos)?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

tpt.3. O país regista alguns dados de TPT desagregados por sexo?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

Clique nas caixas abaixo se as instituições de saúde registarem alguns dados sobre:

- ☐ tpt.4.1. Contactos familiares de adultos (e contactos com >5 anos de idade) de casos de tuberculose pulmonar, nova e recidiva, bacteriologicamente confirmada que iniciaram a TPT
- ☐ tpt.4.2. Contactos familiares de adultos (e contactos com >5 anos de idade) de casos de tuberculose pulmonar, nova e recidiva, bacteriologicamente confirmada que iniciaram a TPT e concluíram a terapêutica
- ☐ tpt.4.3. Contactos familiares de crianças (idade <5 anos) de casos de tuberculose pulmonar, nova e recidiva, bacteriologicamente confirmada que iniciaram a TPT
- ☐ tpt.4.4. Contactos familiares de crianças (<5 anos) que iniciaram a TPT e concluíram a terapêutica
- ☐ tpt.4.5. Indivíduos elegíveis que iniciaram a TPT mas cujo tratamento foi interrompido devido ao desenvolvimento de reações adversas ao medicamento (ADR)

- ☐ tpt.4.6. Indivíduos elegíveis que apresentaram testes AST/ALT numa fase inicial antes do início da TPT
- ☐ tpt.4.7. Indivíduos elegíveis que iniciaram a TPT e desenvolveram tuberculose durante a TPT
- ☐ tpt.4.8. Indivíduos elegíveis que iniciaram a TPT e abandonaram o seguimento
- ☐ tpt.4.9. Contactos familiares que iniciaram a TPT e concluíram a terapêutica
- ☐ tpt.4.10. Indivíduos (isto é, contactos) elegíveis (excluídos para a doença da tuberculose) que iniciaram o tratamento para infeção latente por tuberculose
- ☐ tpt.4.11. Indivíduos que concluíram o tratamento para a infeção por tuberculose

#### **Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

0%

**tpt.5.** A que nível são reportados os dados da TPT?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**tpt.6.** Como são reportados os dados da TPT?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**tpt.7.** Qual a proporção de instituições prestadoras de serviços de tuberculose que reportam quaisquer dados de TPT?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## **Tuberculose e VIH**

**hv.1.** As instituições de saúde (ou seja, unidades de tratamento da tuberculose, unidades de tratamento básico) mantêm algum registo de casos de tuberculose com VIH / casos de VIH com tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**hv.2.** As instituições de saúde mantêm alguns dados de TB-VIH desagregados por grupos etários (ou seja, crianças dos 0-4 anos e dos 5-14 anos; adultos com idade igual ou superior a 15 anos)?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**hv.3.** As instituições de saúde mantêm alguns dados de TB-VIH desagregados por sexo?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

Clique nas caixas abaixo se estas instituições de saúde registarem alguns dados sobre:

- ☐ hv.6.1. Pacientes com TB RR/MRF que foram testados para o VIH no momento do diagnóstico ou com estado de VIH conhecido no momento do diagnóstico de TB RF
- ☐ hv.6.1x. Pacientes com TB XRF que foram testados para o VIH no momento do diagnóstico ou com estado de VIH conhecido no momento do diagnóstico da TB RF
- ☐ hv.6.2. Pacientes coinfectados com TB RR/MRF e com VIH que foram inscritos no tratamento adequado
- ☐ hv.6.2x. Pacientes coinfectados com TB XRF e com VIH que foram inscritos no tratamento adequado
- ☐ hv.6.3. Pacientes coinfectados com TB RR/MRF e com VIH que estavam inscritos no tratamento adequado durante o período abrangido pelo relatório e morreram durante o tratamento
- ☐ hv.6.3x. Pacientes coinfectados com TB XRF e com VIH que estavam inscritos no tratamento adequado durante o período abrangido pelo relatório e morreram durante o tratamento
- ☐ hv.6.4. Pacientes coinfectados com TB RR/MRF e com VIH que estavam inscritos no tratamento adequado durante o período abrangido pelo relatório, mas não foram avaliados
- ☐ hv.6.4x. Pacientes coinfectados com TB XRF e com VIH que estavam inscritos no tratamento adequado durante o período abrangido pelo relatório, mas não foram avaliados
- ☐ hv.6.5. Pacientes coinfectados com TB RR/MRF e com VIH que estavam inscritos no tratamento adequado durante o período abrangido pelo relatório, mas o tratamento falhou
- ☐ hv.6.5x. Pacientes coinfectados com TB XRF e com VIH que estavam inscritos no tratamento adequado durante o período abrangido pelo relatório, mas o tratamento falhou



- ☐ hv.6.6. Pacientes coinfectados com TB RR/MRF e VIH que estavam inscritos no tratamento adequado durante o período abrangido pelo relatório, mas que abandonaram o seguimento
- ☐ hv.6.6x. Pacientes coinfectados com TB XRF e VIH que estavam inscritos no tratamento adequado durante o período abrangido pelo relatório, mas que abandonaram o seguimento
- ☐ hv.6.7. Pacientes coinfectados com TB RR/MRF e com VIH que foram tratados com êxito (curados ou com tratamento concluído)
- ☐ hv.6.7x. Pacientes coinfectados com TB XRF e com VIH que foram tratados com êxito (curados ou com tratamento concluído)
- ☐ hv.6.8. Os pacientes RR/MRF VIH positivos iniciaram ou continuaram com a TARV
- ☐ hv.6.8x. Os pacientes com TB XRF VIH positivos iniciaram ou continuaram com a TARV
- ☐ hv.6.9. Os pacientes com TB VIH positivos iniciaram ou continuaram com a terapia antirretroviral (TARV)
- ☐ hv.6.10. Pacientes com TB RR/MRF confirmada em laboratório registados como VIH positivos
- ☐ hv.6.10x. Pacientes com TB XRF confirmada em laboratório registados como VIH positivos
- ☐ hv.6.11. Pacientes com TB RR/MRF confirmada em laboratório, registados como VIH positivos e inscritos no tratamento adequado
- ☐ hv.6.11x. Pacientes com TB XRF confirmada em laboratório, registados como VIH positivos e inscritos no tratamento adequado
- ☐ hv.6.12. Pacientes com tuberculose, nova e recidiva, que foram testados para o VIH no momento do diagnóstico ou com estado de VIH conhecido no momento do diagnóstico de tuberculose
- ☐ hv.6.13. Pacientes com tuberculose, nova e recidiva, registados como VIH positivos
- ☐ hv.6.14. Casos de coinfeção de tuberculose nova e recidiva/VIH (todas as formas)
- ☐ hv.6.15. Casos de coinfeção de tuberculose nova e recidiva/VIH (todas as formas), que ficaram curados ou concluíram o tratamento
- ☐ hv.6.16. Casos de coinfeção de TB/VIH cujo tratamento falhou
- ☐ hv.6.17. Número de casos de coinfeção de TB/VIH que abandonaram o seguimento
- ☐ hv.6.18. Casos de coinfeção de TB/VIH que morreram durante o tratamento

- ☐ hv.6.19. Casos de coinfeção de TB/VIH que não foram avaliados
- ☐ hv.6.20. Pessoas que vivem com VIH (PVIH) inscritas no tratamento do VIH e que iniciaram a TPT
- ☐ hv.6.21. PVIH inscritas no tratamento do VIH que iniciaram a TPT e concluíram a terapêutica
- ☐ hv.6.22. PVIH inscritas na TARV e que testaram positivo para a doença da tuberculose
- ☐ hv.6.23. PVIH inscritas no tratamento do VIH
- ☐ hv.6.24. PVIH inscritas na TARV, que testaram positivo para a doença da tuberculose e que estavam inscritas no tratamento da tuberculose
- ☐ hv.6.25. PVIH inscritas na TARV
- ☐ hv.6.26. PVIH inscritas na TARV que foram rastreadas pelo menos uma vez para a tuberculose durante o período abrangido pelo relatório
- ☐ hv.6.27. PVIH inscritas na TARV que foram testaram negativo para a doença da tuberculose e que testaram positivo à infeção por tuberculose
- ☐ hv.6.29. PVIH inscritas na TARV que testaram negativo para a doença da tuberculose
- ☐ hv.6.30. PVIH inscritas na TARV que testaram positivo para tuberculose
- ☐ hv.6.31. PVIH inscritas na TARV que foram testadas para a doença da tuberculose
- ☐ hv.6.33. PVIH que iniciaram a TPT mas cujo tratamento foi interrompido devido ao desenvolvimento de ADR
- ☐ hv.6.34. PVIH que apresentaram testes AST/ALT numa fase inicial antes do início da TPT
- ☐ hv.6.35. PVIH que iniciaram a TPT e desenvolveram tuberculose durante a TPT
- ☐ hv.6.36. PVIH que iniciaram a TPT e abandonaram o seguimento
- ☐ hv.6.37. PVIH com tuberculose que têm  $CD4 > 100$
- ☐ hv.6.38. PVIH com tuberculose que têm  $CD4 > 350$
- ☐ hv.6.39. PVIH com tuberculose que apresentam testes com carga viral a cada 6 meses
- ☐ hv.6.40. PVIH inscritas na TARV que foram testaram negativo para a doença da tuberculose e que foram testadas à infeção por tuberculose
- ☐ hv.6.41 PVIH inscritas na TARV que foram testaram negativo para a doença da tuberculose e que testaram positivo à infeção por tuberculose

**Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

0%

**hv.4.** A que nível são reportados os dados da VIH TB?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**hv.5.** Como são reportados os dados da VIH TB?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**hv.7** Qual a proporção de instituições que reportam quaisquer dados de TB/VIH?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## **TB Lab**

**Ib.1.** Estas unidades de diagnóstico da tuberculose / unidades de saúde de referência mantêm algum registro da recepção de amostras de tuberculose e reportam de volta às unidades de referência?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**Ib.5.** Clique nas caixas abaixo se as unidades de diagnóstico da tuberculose / unidades de saúde de referência registarem alguns dados sobre:

- ☐ Ib.5.1. Amostras submetidas a teste
- ☐ Ib.5.2. Amostras submetidas a testes laboratoriais dentro de um prazo especificado
- ☐ Ib.5.3. Amostras recebidas nas unidades de teste e testadas dentro de um prazo especificado
- ☐ Ib.5.4. Resultados de amostras testadas reportados à unidade de referência (ou médico)
- ☐ Ib.5.5. Resultados de amostras testadas reportados à unidade de referência (ou médico) dentro de um prazo especificado
- ☐ Ib.5.6. Pacientes cujos resultados foram reportados, iniciados no tratamento
- ☐ Ib.5.7. Pacientes cujos resultados foram reportados, iniciados no tratamento dentro de um prazo especificado

**Proporção de elementos de dados PBMEF registrados**

0%

**Ib.3.** A que nível são reportados os dados laboratoriais de tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**Ib.4.** Como são reportados os dados laboratoriais de tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**Ib.2.** Que proporção de unidades de diagnóstico da tuberculose reporta quaisquer dados laboratoriais sobre a tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## **Fármacos para a tuberculose e material de diagnóstico**

**dd.1.** Os locais de diagnóstico da tuberculose (por exemplo, Unidade de Tratamento Básico) ou as instalações de armazenamento de medicamentos reportam os stocks de medicamentos e de produtos de diagnóstico da tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**dd.5.** Clique nas caixas abaixo se estas instituições de saúde registarem alguns dados sobre:

- ☐ dd.5.1. Ocorrência de stock de um ou mais produtos de diagnóstico da tuberculose passíveis de reabastecimento após a data de validade
- ☐ dd.5.2. Ocorrência de stockout de uma ou mais formulações para crianças para o tratamento da tuberculose
- ☐ dd.5.3. Ocorrência de stockout de um ou mais medicamentos de primeira linha para o tratamento da tuberculose
- ☐ dd.5.4. Ocorrência de stockout de um ou mais produtos de diagnóstico da tuberculose passíveis de reabastecimento
- ☐ dd.5.5. Ocorrência de stockout de um ou mais medicamentos de segunda linha para o tratamento da tuberculose
- ☐ dd.5.6. Presença de stock de um ou mais medicamentos de primeira linha para o tratamento da tuberculose após a data de validade
- ☐ dd.5.7. Presença de stock de um ou mais medicamentos de segunda linha para tratamento da tuberculose após a data de validade

**Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

14%

**dd.6.** As unidades de saúde reportam algum ou todos os dados acima mencionados pelos nomes genéricos dos medicamentos / produto de diagnóstico para a tuberculose passível de reabastecimento?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não reportado

**dd.2.** A que nível são reportados os dados de stock de medicamentos e produtos de diagnóstico para a tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**dd.3.** Como são reportados os dados de stocks de medicamentos e produtos de diagnóstico para a tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**dd.4.** Que proporção de unidades de diagnóstico ou instalações de armazenamento de medicamentos para a tuberculose reporta qualquer stock de medicamentos e produtos de diagnóstico para a tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## Relatórios de tuberculose por setor privado

**pv.1.** O país regista quaisquer dados de tuberculose de prestadores privados não PNT?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**pv.2.** O país regista alguns dados de tuberculose desagregados por idade de prestadores privados não PNT(ou seja, crianças dos 0-4 anos e dos 5-14 anos; adultos com idade igual ou superior a 15 anos)?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**pv.3.** O país regista quaisquer dados de tuberculose desagregados por sexo de prestadores privados não PNT?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não aplicável

**pv.4.** Clique nas caixas abaixo se os prestadores privados não PNT registarem alguns dados sobre:

- ☐ pv.4.1. Casos de TB RF (TB RR/MRF)
- ☐ pv.4.1a. Casos de TB RF (XRF)
- ☐ pv.4.2. Casos de TB RF (TB RR/MRF) tratados com êxito (curados ou com tratamento concluído)
- ☐ pv.4.2c. Casos de TB RF (XRF) tratados com êxito (curados ou com tratamento concluído)
- ☐ pv.4.3. Casos de TB RF (TB RR/MRF e XRF) inscritos no tratamento adequado por prestadores privados não PNT
- ☐ pv.4.3b. Casos de TB RF (XRF) inscritos no tratamento por prestadores privados não PNT
- ☐ pv.4.4. Casos de TB RF (TB RR/MRF) inscritos no tratamento adequado por prestadores privados não PNT
- ☐ pv.4.4a. Casos novos e recidivos de tuberculose pulmonar clinicamente diagnosticados
- ☐ pv.4.4b. Casos novos e recidivos de tuberculose extrapulmonar



- ☐ pv.4.6. Casos novos e recidivos de tuberculose pulmonar que confirmaram o resultado de suscetibilidade à rifampicina
- ☐ pv.4.7. Casos novos e recidivos de tuberculose (todas as formas)
- ☐ pv.4.8. Casos novos e recidivos de tuberculose (todas as formas) tratados com êxito (curados ou com tratamento concluído)

**Proporção de elementos de dados PBMEF registrados**  
0%

**pv.5.** A que nível são reportados os dados de tuberculose de qualquer prestador privado não PNT?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**pv.6.** Como são reportados os dados de tuberculose de prestadores privados não PNT?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrônico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrônico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrônicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrônico
- ☐ Não aplicável

**pv.7.** Qual a proporção de instituições/prestadores privados não PNT que prestam serviços de tuberculose que reportam quaisquer dados de tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## **Tuberculose entre os Profissionais de Saúde (PS)**

**hw.1.** As unidades de saúde mantêm quaisquer dados sobre o rastreio, diagnóstico e tratamento da tuberculose dos seus profissionais de saúde?

- *Selecione* -

☐ Sim

☐ Não

**hw.2.** As unidades de saúde mantêm quaisquer dados sobre o rastreio, diagnóstico e tratamento dos seus profissionais de saúde desagregados por sexo?

- *Selecione* -

☐ Sim

☐ Não

☐ Não aplicável

**hw.3.** As instalações de saúde reportam sobre o seguinte?

☐ hw.3.1. Número de profissionais de saúde (na US/distrito/nacional)

☐ hw.3.2. Profissionais de saúde rastreados para a doença da tuberculose ativa

☐ hw.3.3. Profissionais de saúde com teste positivo para a doença da tuberculose ativa

☐ hw.3.4. Profissionais de saúde diagnosticados com tuberculose ativa de acordo com a política nacional durante o período abrangido pelo relatório

- ☐ hw.3.5. Profissionais de saúde que foram excluídos para a doença da tuberculose durante o período do relatório
- ☐ hw.3.8. Os profissionais de saúde que foram excluídos para a doença da tuberculose, não são PVIH nem contactos HH elegíveis, testaram positivo à infeção por tuberculose e iniciaram a TPT
- ☐ hw.3.9. Profissionais de saúde que foram excluídos para a doença da tuberculose e que são contactos HH elegíveis de pacientes com tuberculose pulmonar bacteriologicamente confirmada
- ☐ hw.3.10. Os profissionais de saúde que foram excluídos para a doença da tuberculose são contactos HH elegíveis de pacientes com tuberculose pulmonar bacteriologicamente confirmada e iniciaram a TPT
- ☐ hw.3.10a. Profissionais de saúde que iniciaram a TPT e concluíram a TPT
- ☐ hw.3.11. Profissionais de saúde que foram excluídos para a doença da tuberculose, e não são PVIH nem contactos HH elegíveis, e testaram positivo à infeção por tuberculose
- ☐ hw.3.12. Profissionais de saúde que foram excluídos para a doença da tuberculose, são PVIH
- ☐ hw.3.13. Profissionais de saúde que foram excluídos para a doença da tuberculose são PVIH e iniciaram a TPT durante o período abrangido pelo relatório

#### **Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

0%

**hw.4.** A que nível são reportados os dados sobre tuberculose entre os profissionais de saúde?

- *Selecione* -

- ☐ Apenas PNT distrital
- ☐ Apenas PNT nacional
- ☐ Ambos PNT distrital e nacional
- ☐ Não reportado

**hw.5.** Como são reportados os dados sobre tuberculose entre os profissionais de saúde?

- *Selecione* -

- ☐ Em papel
- ☐ Formato eletrónico (ficheiros Excel, enviados por email ou flash drive, etc.)
- ☐ Formato eletrónico (DHIS 2)
- ☐ Outros meios eletrónicos (online/website)
- ☐ Híbrido: em papel e formato eletrónico
- ☐ Não aplicável

**hw.6.** Que proporção de unidades de saúde informa sobre a tuberculose entre os profissionais de saúde?

- *Selecione* -

- ☐ 100%
- ☐ 99%–75%
- ☐ 74%–50%
- ☐ 49%–25%
- ☐ 24%–1%
- ☐ 0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## Unidades de saúde que prestam serviços de tuberculose

hf.1. O país mantém um registo das unidades de saúde que prestam serviços de diagnóstico e/ou tratamento da tuberculose?

- *Selecione* -

- ☐ Sim
- ☐ Não

hf.2. Clique nas caixas abaixo se o país se reportar atualmente:

- ☐ hf.2.1. Unidades de saúde que fornecem testes rápidos de diagnóstico recomendados pela OMS
- ☐ hf.2.2. Unidades de saúde que fornecem testes rápidos de diagnóstico recomendados pela OMS incluídos num programa de garantia de qualidade
- ☐ hf.2.3. Unidades de saúde que reportam casos de tuberculose extrapulmonar
- ☐ hf.2.4. Unidades de saúde que reportam o número de pacientes com tuberculose presuntiva
- ☐ hf.2.5. Unidades de saúde que implementam a uma deteção intensificada de casos
- ☐ hf.2.6. Unidades de saúde (tanto públicas como privadas) que fornecem o tratamento adequado aos pacientes com TB RF (TB RR/MRF e XRF)
- ☐ hf.2.7. Número de unidades saúde no país

**Proporção de elementos de dados PBMEF registados**

0%

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns elementos de dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## Tuberculose nas prisões

**pn.1.** Clique nas caixas abaixo se o país registar alguns dados sobre:

- ☐ pn.1.1. Prisões que procedem ao rastreio da tuberculose de acordo com a política nacional
- ☐ pn.1.2. Prisões que procedem ao rastreio da tuberculose por meio de raio-X torácico

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo:

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## Política de tuberculose

**py.1.** A política nacional inclui uma disposição para obter e fornecer formulações favoráveis às crianças e medicamentos de primeira linha para o tratamento da tuberculose?

- Selecione -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**py.2.** A política nacional inclui uma disposição para obter e fornecer formulações favoráveis às crianças e medicamentos de segunda linha para o tratamento da tuberculose?

- Selecione -

- ☐ Sim
- ☐ Não

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo:

☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

## Indicadores de Compromisso/Autoconfiança

Para cada um dos pontos de dados abaixo que o PNT recolhe, assinale a caixa correspondente

- ☐ Financiamento previsto de fontes internas para o programa da tuberculose
- ☐ Financiamento previsto de todas as fontes para o programa da tuberculose
- ☐ Financiamento da tuberculose recebido de todas as fontes (internas, Fundo Global, USAID e outras fontes)
- ☐ Custos totais dos serviços de tuberculose (diagnóstico e tratamento)
- ☐ Financiamento da tuberculose recebido de fontes internas (incluindo empréstimos)
- ☐ Financiamento interno para a aquisição de medicamentos de primeira linha (MPL) para a tuberculose
- ☐ Financiamento interno para a aquisição de medicamentos de segunda linha (MSL) para a tuberculose
- ☐ Financiamento interno para a aquisição de produtos de laboratório de tuberculose (reagentes ou cartuchos de diagnóstico rápido [DRO] recomendados pela OMS, equipamento de DRO)
- ☐ Despesas do PNT por fonte de financiamento (por exemplo, interno, Fundo Global, USAID)
- ☐ Custos pagos pelos serviços de tuberculose ao abrigo de seguros (tal como registado pelos executores de regime de seguros, se aplicável)
- ☐ Pacientes com tuberculose (nova e recidiva) notificados, cujo tratamento clínico estava coberto por um seguro
- ☐ Famílias afetadas pela tuberculose que incorrem em custos elevadíssimos devido à tuberculose
- ☐ Concursos para contratos com ONG ou utilização de outros mecanismos de contratação social com fundos governamentais
- ☐ Número total de colaboradores e consultores do PNT
- ☐ Províncias onde as unidades de governação subnacionais relevantes adotaram todos os quadros legais descentralizados relacionados com a tuberculose
- ☐ Consultas do PNT com a sociedade civil/sobreviventes da tuberculose para analisar os progressos no ano do relatório

- ☐ Sociedade civil e sobreviventes da tuberculose convidados pelo PNT a participar na mais recente missão de monitorização conjunta (MMC)/revisões externas
- ☐ Consultas do PNT com a sociedade civil e sobreviventes da tuberculose para desenvolver o plano estratégico nacional (PEN) e propostas de doadores
- ☐ O envolvimento das sociedades civis e sobreviventes da tuberculose no desenvolvimento/planeamento da investigação, implementação e disseminação da tuberculose
- ☐ Participação de entidades subnacionais em qualquer uma das 3 plataformas disponíveis (consulta PEN, revisão do programa ou MMC)
- ☐ Pessoal do PNT que participa na formação sobre tuberculose e sensibilização para a questão do género
- ☐ PNT e pessoal de gestão provincial por sexo
- ☐ Mulheres sobreviventes da tuberculose incluídas em qualquer evento PNT no ano do relatório
- ☐ Dados desagregados por género para resultados de tratamento disponíveis para a coorte mais recente
- ☐ Stockout de uma ou mais MPL para tratamento em qualquer local de tratamento da tuberculose (por exemplo, Unidade de Tratamento Básico [UTB]) ou instalações de armazenamento de medicamentos
- ☐ Stockout de um ou mais MSL para tratamento em qualquer local de tratamento da tuberculose (por exemplo, UTB) ou instalações de armazenamento de medicamentos
- ☐ Stockout de um ou mais produtos de diagnóstico da tuberculose passíveis de reabastecimento em qualquer unidade de diagnóstico da tuberculose (por exemplo, UTB) ou instalações de armazenamento (central ou subnacional)
- ☐ MPL para tratamento após a data de validade em qualquer local de tratamento da tuberculose (por exemplo, UTB) ou instalações de armazenamento de medicamentos
- ☐ MSL para tratamentos que já tenham expirado em qualquer local de tratamento da tuberculose (por exemplo, UTB) ou instalações de armazenamento de medicamentos
- ☐ Produtos de diagnóstico da tuberculose passíveis de reabastecimento que já tenham expirado em qualquer local de diagnóstico da tuberculose (por exemplo, UTB) ou instalações de armazenamento de medicamentos



- ☐ Stockout de uma ou mais formulações favoráveis às crianças para o tratamento da tuberculose em qualquer local de diagnóstico da tuberculose (por exemplo, UTB) ou instalações de armazenamento de medicamentos

**Comentários:** Escreva qualquer comentário ou esclarecimento no espaço abaixo. Se aplicável, pode fornecer comentários sobre (1) por que motivo alguns dados não foram recolhidos, por exemplo, devido a nenhuma intervenção ou falta de ferramentas de recolha de dados; (2) o motivo para uma cobertura inferior a 100%, por exemplo, diferencial urbano/rural na implementação do programa.

- ☐ Preenchi esta secção

*Assinale esta caixa se tiver adicionado toda a informação disponível para esta secção.*

This publication was produced with the support of the United States Agency for International Development (USAID) under the terms of the TB Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH) Associate Award No. 7200AA18LA00007. TB DIAH is implemented by the University of North Carolina at Chapel Hill, in partnership with John Snow, Inc. Views expressed are not necessarily those of USAID or the United States government. TL-21-90-TB-a

